




# Animedazon<sup>®</sup> Spray

Clortetraciclina (Cloridrato)





# Animedazon® Spray

2.45 % m/m spray para pulverização cutânea em bovinos, ovinos e suínos

**Animedazon® Spray** é bastante eficaz no tratamento de infecções causadas por agentes sensíveis à clortetraciclina. O spray de aplicação tópica contém 3,210 g de cloridrato de clortetraciclina. Este antibiótico de largo espectro, com aplicação prática e versátil, pertence ao grupo das tetraciclinas.

## Animedazon® Spray é utilizado em:

- Feridas traumáticas
- Feridas cirúrgicas
- Dermatite interdigital (peeira e epidermatite)
- Dermatite digital

## Quais as vantagens do uso do Animedazon® Spray?

- Registado para três espécies animais: bovinos, ovinos e suínos
- Antibiótico de largo espectro com eficácia comprovada
- Zero dias de intervalo de segurança na carne e no leite
- Fácil e rápida aplicação através de spray
- Adaptador plástico desenhado para um uso mais fácil
- Seca muito rápido, evitando perdas por escorrimento de produto (gotejamento)
- Esfera no seu interior para permitir melhor aproveitamento



### Animedazon® Spray

**Seca muito rápido,  
sem perdas por escorrimento  
de produto (gotejamento)**

**Animedazon Spray 2,45 % m/m spray para pulverização cutânea em bovinos, ovinos e suínos. Composição:** Cada spray contém: **Princípio activo:** Cloridrato de clortetraciclina 3,210 g (equivalente a 2,45% m/m), (equivalente a 2,983 g de clortetraciclina). **Excipiente (s):** Azul patentado V 85% (E 131) 0,23 g, Isobutano 92,2 g. **Indicações:** Tratamento de feridas traumáticas ou cirúrgicas contaminadas por agentes sensíveis à clortetraciclina. Pode também ser utilizado como parte do tratamento de infecções cutâneas ou podais, em particular dermatite interdigital (peeira e epidermatite) e dermatite digital causadas por agentes sensíveis à clortetraciclina. **Contraindicações:** Não utilizar em caso de hipersensibilidade às tetraciclinas. Não utilizar no úbere de vacas cujo leite se destina ao consumo humano. **Reacções adversas:** reacções de hipersensibilidade podem ocorrer raramente. **Outras precauções:** A parte manchada da pele do porco deve ser retirada antes de o animal ser utilizado para consumo humano. **Intervalo de segurança:** Carne e leite: zero dias. **Apenas para uso animal – medicamento de uso veterinário. Titular da autorização de utilização no mercado:** aniMedica GmbH, Im Sudfeld 9, 48308 Senden-Bosenvell, Germany. 03/2010.